

# M-23

トウキシャクヤクサン

漢方製剤

## マツウラ 当帰芍薬散料 エキス顆粒

貯法：室温保存。その他、  
「取扱い上の注意」の項参照  
使用期限：容器又は外箱に表示

承認番号	(61AM)第4173号
薬価収載	1986年10月
販売開始	1986年10月

### 《組成・性状》

#### 1. 組成

本品7.5g中

日局トウキ	3.0g
日局センキュウ	3.0g
日局シャクヤク	4.0g
日局ブクリョウ	4.0g
日局ソウジュツ	4.0g
日局タクシャ	4.0g

上記より製した日局当帰芍薬散エキス8.4gを含有する。

(本品は、軟エキスを使用しており、軟エキス8.4gは乾燥エキス4.2gに相当する。)

添加物として、ヒプロメロース、ステアリン酸Mg、乳糖水和物、デキストリン、トウモロコシデンプンを含有する。

#### 2. 製剤の性状

本品は淡褐色の顆粒剤で、特異なおいがある。

識別コード (分包品)：23, マツウラ

### 《効能・効果》

比較的体力が乏しく、冷え症で貧血の傾向があり、疲労しやすく、ときに下腹部痛、頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを訴える次の諸症：

月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害 (貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ)、めまい、頭重、肩こり、腰痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみ

### 《用法・用量》

通常成人1日7.5gを2～3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢・体重・症状により適宜増減する。

### 《使用上の注意》

#### 1. 慎重投与 (次の患者には慎重に投与すること)

- (1)著しく胃腸の虚弱な患者 [食欲不振、胃部不快感、悪心、嘔吐、腹痛、下痢等があらわれることがある。]
- (2)食欲不振、悪心、嘔吐のある患者 [これらの症状が悪化するおそれがある。]

#### 2. 重要な基本的注意

- (1)本剤の使用にあたっては、患者の証 (体質・症状) を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避けること。
- (2)他の漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注意すること。

#### 3. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していないため、発現頻度は不明である。

	頻度不明
過敏症 <sup>注)</sup>	発疹、掻痒等
肝臓	**肝機能異常 (AST (GOT)、ALT (GPT) 等の上昇)
消化器	食欲不振、胃部不快感、悪心、嘔吐、腹痛、下痢等

注) このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。

#### 4. 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量するなど注意すること。

#### 5. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

妊娠中の投与に関する安全性は確立していないので、妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

#### 6. 小児等への投与

小児等に対する安全性は確立していない。[使用経験が少ない]

### 《取扱い上の注意》

- 直射日光・湿気を避けて保管すること。
- 吸湿し易いため、開封後は密栓して保管すること。
- 天然物を成分としていますので、若干色調の異なることがあります。効果には変わりありません。


### 《包装》

- 500g
- 2.5g × 84包
- 2.5g × 300包

### 《文献請求先》

松浦薬業株式会社 薬務学術部  
〒459-8001 名古屋市緑区大高町寅新田36

\*製造販売元

 松浦薬業株式会社  
名古屋市緑区大高町寅新田36