

ぞく めい とう
続命湯エキス〔細粒〕39

本方は、「金匱要略」に記載されている処方方で、体力が中等度以上の方のしびれ、筋力低下、高血圧による諸症状、神経痛、関節のはれや痛み、むくみなどの症状に奏効します。

 ● 使用上の注意 ●



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1)医師の治療を受けている人
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3)体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）
- (4)胃腸の弱い人
- (5)発汗傾向の著しい人
- (6)高齢者
- (7)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- (8)次の症状のある人
排尿困難
- (9)次の診断を受けた人
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感

3. 1ヵ月位（頭痛に服用する場合には5～6回）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

● 効能・効果 ●

体力中等度以上のものの次の諸症：

しびれ、筋力低下、高血圧に伴う症状（めまい、耳鳴り、肩こり、頭痛、頭重、頭部圧迫感）、気管支炎、気管支ぜんそく、神経痛、関節のはれや痛み、頭痛、むくみ

●用法・用量●

次の量を食前又は食間に水又は温湯で服用してください。
(食間とは食後2～3時間を指します。)

年 齢	1 回 量		1日服用回数
	分包剤	大入り剤	
成人(15歳以上)	1 包	2.0g	3 回
15歳未満	服用しないでください		

〔用法・用量に関連する注意〕

用法・用量を厳守してください。

●成分・分量●

本品3包(6.0g)又は6.0gは

キョウニン	1.33g	センキュウ	0.67g
マオウ	1.0g	ショウキョウ	0.67g
ケイヒ	1.0g	カンゾウ	0.67g
ニンジン	1.0g	セッコウ	2.0g
トウキ	1.0g		

上記より製した続命湯水製エキス2.32g(乾燥物換算で約1.39gに相当)を含有する細粒剤です。添加物としてメタケイ酸アルミン酸Mg、乳糖、トウモロコシデンプンを含有します。

●保管及び取扱い上の注意●

- (1)直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4)本剤は天然物を成分としていますので、製品により若干色調が異なることがあります。効果には変わりありません。
- (5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

●お問い合わせ先●

松浦薬業株式会社 お客様相談窓口

TEL (052)883-5172 受付時間 10:00～17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元

 **松浦薬業株式会社**
名古屋市昭和区円上町24-21