

# 麻黄湯エキス〔細粒〕59

本方は、傷寒論の代表的な発汗剤で、平素丈夫で頑健な体質の人の感冒に適した漢方処方ですが、小児は新陳代謝が盛んで陽気が強いので、この証のものが意外に多いものです。

## ⚠️ • 使用上の注意 •

### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

**次の人は服用しないでください。**

- (1)体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）
- (2)生後3ヵ月未満の乳児



### 相談すること

**1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。**

- (1)医師の治療を受けている人
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3)胃腸の弱い人
- (4)発汗傾向の著しい人
- (5)高齢者
- (6)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- (7)次の症状のある人 排尿困難
- (8)次の診断を受けた人 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

**2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。**

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感
その他	発汗過多、全身脱力感

**3. 1ヵ月位（感冒、鼻かぜに服用する場合には5～6回）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。**

## ● 効能・効果 ●

体力充実して、かぜのひきはじめて、さむけがして発熱、頭痛があり、せきが出て身体のふしぶしが痛く汗が出ていないものの次の諸症：

感冒、鼻かぜ、気管支炎、鼻づまり

(裏面につづく)

## ●用法・用量●

次の量を食前又は食間に温湯又は水で服用してください。  
(食間とは食後2～3時間を指します。)

年 齢	1 回 量		1 日服用回数
	分包剤	大入り剤	
大人(15才以上)	1 包	2.0 g	3 回
15才未満7才以上	2/3包	1.3 g	
7才未満4才以上	1/2包	1.0 g	
4才未満2才以上	1/3包	0.7 g	
2才未満	1/4包	0.5 g以下	

### 【用法・用量に関連する注意】

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

## ●成分・分量●

本品3包(6.0g)又は6.0gは

(マオウ……………2.5g ケイヒ……………2.0g)  
(キョウニン……………2.5g カンゾウ……………0.75g)

上記より製した麻黄湯エキス(1/2量)1.8g(乾燥物換算で約0.9gに相当)を含有する細粒剤です。添加物としてメタケイ酸アルミン酸Mg、乳糖、バレシヨデンブン、香料を含有します。

## ●保管及び取扱い上の注意●

- (1)直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4)本剤は天然物を成分としていますので、製品により若干色調が異なることがあります。効果には変わりありません。
- (5)分包剤で1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- (6)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

## ●お問い合わせ先●

松浦薬業株式会社 お客様相談窓口

TEL (052)883-5172 受付時間 10:00～17:00 (土・日・祝日を除く)

製造販売元

 **松浦薬業株式会社**  
名古屋市昭和区円上町24-21