


漢方製剤

第2類医薬品

ぼうふうつうしょうさん  
**防風通聖散エキス〔細粒〕57**

本方は腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちな人の肥満症や高血圧に伴う動悸・肩こり・のぼせ・便秘などに用いられます。

 **● 使用上の注意 ●**

 **してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください。 生後3ヵ月未満の乳児
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。  
他の瀉下薬（下剤）
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。



**相談すること**

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1)医師の治療を受けている人
  - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
  - (3)体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）
  - (4)胃腸が弱く下痢しやすい人
  - (5)発汗傾向の著しい人
  - (6)高齢者
  - (7)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
  - (8)次の症状のある人  
むくみ、排尿困難
  - (9)次の診断を受けた人  
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性ありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、腹部膨満、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛
精神神経系	めまい
その他	発汗、動悸、むくみ、頭痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
*腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
下痢、便秘
4. 1ヵ月位（便秘に服用する場合には1週間位）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

### ●効能・効果●

体力充実して、腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなものの次の諸症：  
高血圧や肥満に伴う動悸・肩こり・のぼせ・むくみ・便秘、蓄膿症（副鼻腔炎）、湿疹・皮膚炎、ふきでもの（にきび）、肥満症

### ●用法・用量●

次の量を食前又は食間に水又は温湯で服用してください。  
（食間とは食後2～3時間を指します。）

年 齢	1 回 量		1日服用回数
	分包剤	大入り剤	
大人(15才以上)	1 包	2.0 g	3 回
15才未満7才以上	2/3包	1.3 g	
7才未満4才以上	1/2包	1.0 g	
4才未満2才以上	1/3包	0.7 g	
2才未満	1/4包	0.5 g以下	

### 〔用法・用量に関連する注意〕

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

### ●成分・分量●

本品3包(6.0g)又は6.0gは

トウキ……………0.6g	マオウ……………0.6g
シャクヤク……………0.6g	ダイオウ……………0.75g
センキュウ……………0.6g	ポウショウ……………0.75g
サンシシ……………0.6g	ビャクジュツ……………1.0g
レンギョウ……………0.6g	キキョウ……………1.0g
ハッカ……………0.6g	オウゴン……………1.0g
ショウキョウ……………0.2g	カンゾウ……………1.0g
ケイガイ……………0.6g	セッコウ……………1.0g
ポウフウ……………0.6g	カッセキ……………1.5g

上記より製した防風通聖散エキス(1/2量)5.4g(乾燥物換算で約2.7gに相当)を含有する細粒剤です。添加物としてメタケイ酸アルミン酸Mg、ヒプロメロース、乳糖、トウモロコシデンプン、香料を含有します。

### ●保管及び取扱い上の注意●

- (1)直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。）
- (4)本剤は天然物を成分としていますので、製品により若干色調が異なることがあります。効果には変わりありません。
- (5)分包剤で1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- (6)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

### ●お問い合わせ先●

松浦薬業株式会社 お客様相談窓口  
TEL (052)883-5172 受付時間 10:00～17:00（土・日・祝日を除く）

製造販売元

 **松浦薬業株式会社**  
名古屋市昭和区円上町24-21