

漢方濃縮煎剤六君子湯^{りっくんしとう}43

本品は、お湯に溶かして服用する濃縮液体タイプの漢方製剤です。六君子湯本来の煎じ薬に近い服用感と香りを手軽に再現できます。補気剤の代表である四君子湯に半夏と陳皮を加えた処方、体力中等度以下で胃腸が弱った方に奏効いたします。

1回分ずつの包装で、外出先にも携帯できます。



●使用上の注意●



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

●効能・効果●

体力中等度以下で、胃腸が弱く、食欲がなく、みぞおちがつかえ、疲れやすく、貧血性で手足が冷えやすいものの次の諸症：

胃炎、胃腸虚弱、胃下垂、消化不良、食欲不振、胃痛、嘔吐

●用法・用量●

次の量を食前又は食間に約20～100mLの水又は温湯を加え、よく攪拌して服用してください。（食間とは食後2～3時間を指します。）

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	1包	2回
15歳未満	服用しないでください	

〔用法・用量に関連する注意〕

- 用法・用量を厳守してください。
- 開封前によく振り、開封後はすみやかに服用してください。
- 分包の開封時に内容液が飛び散らないよう注意してください。

●成分・分量● 1日量2包(5g)中

六君子湯抽出物	5g
(ニンジン……………2g 半夏……………2g)	
(ブクリョウ……………2g ハンゲ……………2g)	
(チンピ……………1g タイソウ……………1g)	
(カンゾウ……………0.5g ショウキョウ……………0.25g)	

添加物として、エタノールを含有します。

●保管及び取扱い上の注意●

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- (4)本剤は天然物を成分としていますので、製品により若干色調が異なったり、沈殿を生じる場合がありますが、効果には変わりありません。
- (5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (6)携帯するときは、分包が折れ曲がらないようにしてください。

●お問い合わせ先●

松浦薬業株式会社 お客様相談窓口

TEL (052)883-5172 受付時間 10:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

製造販売元

 **松浦薬業株式会社**
名古屋市昭和区円上町24-21