

# 漢方濃縮煎剤加味逍遙散<sup>かみしょうようさん</sup>24

本品は、お湯に溶かして服用する濃縮液体タイプの漢方製剤です。漢方薬本来の煎じ薬に近い服用感を手軽に再現できます。

体力中等度以下で、疲れやすく、情緒不安定な傾向があり、肩こり、便秘などの症状が見られる人や、そのような症状のある女性の月経不順や更年期障害などに用いられます。

1回分ずつの包装で外出先にも携帯できます。



## ・使用上の注意・



### 相談すること

#### 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1)医師の治療を受けている人
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3)胃腸の弱い人
- (4)高齢者
- (5)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- (6)次の症状のある人  
むくみ
- (7)次の診断を受けた人  
高血圧、心臓病、腎臓病

#### 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。

#### 3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

下痢

4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## ●効能・効果●

体力中等度以下で、のぼせ感があり、肩がこり、疲れやすく、精神不安やいらだちなどの精神神経症状、ときに便秘の傾向のあるものの次の諸症：

冷え症、虚弱体質、月経不順、月経困難、更年期障害、血の道症、不眠症

### 〔効能・効果に関連する注意〕

血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことです。

## ●用法・用量●

次の量を食前又は食間に約20～100mLの水又は温湯を加え、よく攪拌して服用してください。  
(食間とは食後2～3時間を指します。)

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1包	2回
15歳未満	服用しないでください	

### 〔用法・用量に関連する注意〕

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)開封前によく振り、開封後はすみやかに服用してください。
- (3)分包の開封時に内容液が飛び散らないよう注意してください。

## ●成分・分量● 1日量2包(10.6g)中

加味逍遙散抽出物	10.6g				
トウキ	2g	サイコ	2g	カンゾウ	1g
シャクヤク	2g	ポタンピ	1.33g	ショウキョウ	0.67g
ソウジュツ	2g	サンシシ	1.33g	ハッカ	0.67g
ブクリョウ	2g				

添加物として、エタノールを含有します。

## ●保管及び取扱い上の注意●

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- (4)本剤は天然物を成分としていますので、製品により若干色調が異なる場合がありますが、効果には変わりありません。
- (5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (6)携帯するときは、分包が折れ曲がらないようにしてください。

## ●お問い合わせ先●

松浦薬業株式会社 お客様相談窓口

TEL (052)883-5172 受付時間 10:00～17:00 (土・日・祝日を除く)