



M-46

シチモツコウカトウ

漢方製剤

承認番号	(61AM)第4171号
薬価収載	1986年10月
販売開始	1986年10月

マツウラ 七物降下湯 エキス顆粒

貯法：室温保存。その他、
「取扱い上の注意」の項参照
使用期限：容器又は外箱に表示

《組成・性状》

1. 組成

本品7.5g中

日局トウキ	3.0g
日局シャクヤク	3.0g
日局センキュウ	3.0g
日局ジオウ	3.0g
日局チョウトウコウ	4.0g
日局オウギ	3.0g
日局オウバク	2.0g

上記より製した七物降下湯乾燥エキス5.0gを含有する。

添加物として、ヒプロメロース、ステアリン酸Mg、乳糖水和物、デキストリン、トウモロコシデンプンを含有する。

2. 製剤の性状

本品は褐色の顆粒剤で、特異なおいがあり、味は初め渋く、後に苦い。

識別コード(分包品)：46, マツウラ

《効能・効果》

身体虚弱の傾向のあるものの次の諸症：
高血圧に伴う随伴症状(のぼせ、肩こり、耳なり、頭重)

《用法・用量》

通常成人1日7.5gを2～3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢・体重・症状により適宜増減する。

《使用上の注意》

1. 慎重投与(次の患者には慎重に投与すること)

- (1)著しく胃腸の虚弱な患者[食欲不振、胃部不快感、悪心、嘔吐、下痢等があらわれるおそれがある。]
- (2)食欲不振、悪心、嘔吐のある患者[これらの症状が悪化するおそれがある。]

2. 重要な基本的注意

- (1)本剤の使用にあたっては、患者の証(体質・症状)を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避けること。
- (2)他の漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注意すること。

3. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していないため、発現頻度は不明である。

	頻度不明
消化器	食欲不振、胃部不快感、悪心、嘔吐、下痢等

4. 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量するなど注意すること。

5. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

妊娠中の投与に関する安全性は確立していないので、妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

6. 小児等への投与

小児等に対する安全性は確立していない。[使用経験が少ない]

《取扱い上の注意》

- 直射日光・湿気を避けて保管すること。
- 吸湿し易いため、開封後は密栓して保管すること。
- 天然物を成分としていますので、若干色調の異なることがあります。効果には変わりありません。

《包装》

500g
2.5g×84包
2.5g×300包

**《文献請求先・製品情報お問合せ先》

松浦薬業株式会社 信頼性保証部
〒459-8001 名古屋市緑区大高町寅新田36
TEL 052-621-3291 FAX 052-622-3801

*製造販売元

 松浦薬業株式会社
名古屋市緑区大高町寅新田36