

この医薬品・医療用具等安全性情報は、厚生労働省において収集された副作用情報をもとに、医薬品・医療用具等のより安全な使用に役立てていただくために、医療関係者に対して情報提供されるものです。

平成 17 年（2005 年）5 月
厚生労働省医薬食品局

3

使用上の注意の改訂について
（その 165）

前々号（医薬品・医療用具等安全性情報 No.211）以降に改訂を指導した医薬品の使用上の注意（本号の「2 重要な副作用等に関する情報」で紹介したものを除く。）について、改訂内容、主な該当販売名、参考文献等をお知らせいたします。

11 漢方製剤
防己黄耆湯

[販売名] ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒（医療用）（ツムラ）他

[副作用
（重大な副作用）] 間質性肺炎：発熱，咳嗽，呼吸困難，肺音の異常（捻髪音）等があらわれた場合には，本剤の投与を中止し，速やかに胸部X線等の検査を実施するとともに副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。また，発熱，咳嗽，呼吸困難等があらわれた場合には，本剤の服用を中止し，ただちに連絡するよう患者に対し注意を行うこと。

参考 企業報告

12 漢方製剤
六君子湯

[販売名] ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）（ツムラ）他

[副作用
（重大な副作用）] 肝機能障害，黄疸：AST（GOT），ALT（GPT），Al-P， γ -GTP等の著しい上昇を伴う肝機能障害，黄疸があらわれたことがあるので，観察を十分に行い，異常が認められた場合には投与を中止し，適切な処置を行うこと。

参考 企業報告