

M-14

ハンゲシャシントウ

漢方製剤

マツウラ 半夏瀉心湯 エキス顆粒

貯法：室温保存。その他、
「取扱い上の注意」の項参照
使用期限：容器又は外箱に表示

承認番号	(61AM)第4221号
薬価収載	1986年10月
販売開始	1986年10月

《禁忌 (次の患者には投与しないこと)》

- (1)アルドステロン症の患者
 - (2)ミオパチーのある患者
 - (3)低カリウム血症のある患者
- 〔(1)~(3)：これらの疾患及び症状が悪化するおそれがある。〕

《組成・性状》

1. 組成

本品 6 g 中

日局ハンゲ	5.0 g
日局オウゴン	2.5 g
日局カンキョウ	2.5 g
日局ニンジン	2.5 g
日局カンゾウ	2.5 g
日局タイソウ	2.5 g
日局オウレン	1.0 g

上記より製した日局半夏瀉心湯エキス7.3gを含有する。
(本品は、軟エキスを使用しており、軟エキス7.3gは乾燥エキス2.9gに相当する。)

添加物として、ヒプロメロース、ステアリン酸Mg、乳糖水和物、デキストリン、トウモロコシデンプンを含有する。

2. 製剤の性状

本品は淡褐色の顆粒剤で、特異なおいがあり、味は苦く、わずかに辛く甘い。

識別コード (分包品)：14, マツウラ

《効能・効果》

みぞおちがつかえ、時に悪心、嘔吐があり、食欲不振で腹が鳴って軟便又は下痢の傾向のあるものの次の諸症：
急・慢性胃腸カタル、酸酵性下痢、消化不良、胃下垂、神経性胃炎、胃弱、二日酔、げっぷ、胸やけ、口内炎、神経症

《用法・用量》

通常成人 1日 6g を 2~3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢・体重・症状により適宜増減する。

《使用上の注意》

1. 重要な基本的注意

- (1)本剤の使用にあたっては、患者の証 (体質・症状) を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避けること。
- (2)本剤にはカンゾウが含まれているので、血清カリウム値や血圧値等に十分留意し、異常が認められた場合には投与を中止すること。
- (3)他の漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注意すること。

2. 相互作用

併用注意 (併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
(1)カンゾウ含有製剤	偽アルドステロン症があらわれやすくなる。また、低カリウム血症の結果として、ミオパチーがあらわれやすくなる。〔「重大な副作用」の項参照〕	グリチルリチン酸及び利尿剤は、尿管でのカリウム排泄促進作用があるため、血清カリウム値の低下が促進されることが考えられる。
(2)グリチルリチン酸及びその塩類を含有する製剤		
(3)ループ系利尿剤		
フロセミド エタクリン酸		

(4)チアジド系利尿剤
トリクロルメチアジド

3. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していないため、発現頻度は不明である。

(1)重大な副作用

- ①間質性肺炎：発熱、咳嗽、呼吸困難、肺音の異常 (捻髪音) 等があらわれた場合には、本剤の投与を中止し、速やかに胸部X線等の検査を実施するとともに副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。また、発熱、咳嗽、呼吸困難等があらわれた場合には、本剤の服用を中止し、ただちに連絡するよう患者に対し注意を行うこと。
- ②偽アルドステロン症：低カリウム血症、血圧上昇、ナトリウム・体液の貯留、浮腫、体重増加等の偽アルドステロン症があらわれることがあるので、観察 (血清カリウム値の測定等) を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。
- ③ミオパチー：低カリウム血症の結果としてミオパチーがあらわれることがあるので、観察を十分に行い、脱力感、四肢痙攣・麻痺等の異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。
- ④肝機能障害、黄疸：AST (GOT)、ALT (GPT)、Al-P、 γ -GTPの上昇等を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

(2)その他の副作用

	頻度不明
過敏症 ^{注)}	発疹、蕁麻疹等

注) このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。

4. 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量するなど注意すること。

5. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

妊娠中の投与に関する安全性は確立していないので、妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

6. 小児等への投与

小児等に対する安全性は確立していない。〔使用経験が少ない〕

《取扱い上の注意》

- 直射日光・湿気を避けて保管すること。
- 吸湿し易いため、開封後は密栓して保管すること。
- 天然物を成分としていますので、若干色調の異なる場合がありますが、効果には変わりありません。


《包装》

500g 2g×84包 2g×300包

**《文献請求先・製品情報お問合せ先》

松浦薬業株式会社 信頼性保証部
〒466-0054 名古屋市昭和区円上町24-21
TEL 052-883-5172 FAX 052-883-5159

製造販売元

**  松浦薬業株式会社
名古屋市昭和区円上町24-21