

この添付文書は本剤とともに保管し、服用の際には、よくお読みください。

漢方製剤

第2類医薬品

ほちゅうえっきとう  
**補中益気湯エキス〔細粒〕58**

本方は中（消化器）を補い、気（元気）を益す効がある意味で補中益気湯の名があり、別名を「医王湯」といいます。体力、気力の衰えが激しい時、まず試してみる漢方薬といえます。

 ●使用上の注意●

 **してはいけないこと**

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

**次の人は服用しないでください。**

生後3カ月未満の乳児



**相談すること**

**1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。**

- (1)医師の治療を受けている人
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人

**2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。**

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

**3. 1ヵ月位（感冒に服用する場合には5～6日間）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。**

●**効能・効果**●

体力虚弱で、元気がなく、胃腸のはたらきが衰えて、疲れやすいものの次の諸症：

虚弱体質、疲労倦怠、病後・術後の衰弱、食欲不振、ねあせ、感冒

（裏面につづく）

## ●用法・用量●

次の量を食前又は食間に水又は温湯で服用してください。  
(食間とは食後2～3時間を指します。)

年 齢	1 回 量		1日服用回数
	分包剤	大入り剤	
成人(15歳以上)	1 包	2.0 g	3 回
15歳未満7歳以上	2/3包	1.3 g	
7歳未満4歳以上	1/2包	1.0 g	
4歳未満2歳以上	1/3包	0.7 g	
2歳未満	1/4包	0.5 g以下	

### 〔用法・用量に関連する注意〕

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合のみ服用させてください。

## ●成分・分量●

本品3包(6.0g)又は6.0gは

ニンジン	2.0 g	タイソウ	1.0 g
ビャクシュツ	2.0 g	サイコ	1.0 g
オウギ	2.0 g	カンゾウ	0.75 g
トウキ	1.5 g	ショウキョウ	0.25 g
チンピ	1.0 g	ショウマ	0.5 g

上記より製した補中益気湯エキス(1/2量)5.4g(乾燥物換算で約2.7gに相当)を含有する細粒剤です。添加物としてメタケイ酸アルミン酸Mg、ヒプロメロース、結晶セルロース、乳糖、トウモロコシデンプン、香料を含有します。

## ●保管及び取扱い上の注意●

- (1)直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4)本剤は天然物を成分としていますので、製品により若干色調が異なることがありますが、効果には変わりありません。
- (5)分包剤で1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- (6)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

## ●お問い合わせ先●

松浦薬業株式会社 お客様相談窓口

TEL (052)883-5172 受付時間 10:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

製造販売元

 **松浦薬業株式会社**  
名古屋市昭和区円上町24-21