

この添付文書は本剤とともに保管し、
服用の際には、よくお読みください。

第2類医薬品

貧血性の耳鳴り・手足のだるさに〈生薬製剤〉

ジメイ丸[®]

(中国名：耳鳴丸)

特 徴

ジメイ丸は、中国名では「耳鳴丸」と表記され、その名の示すとおり、特に貧血性の耳鳴りに対する優れた効き目をはじめとし、腰痛、手足のだるさなどの症状を改善します。

- 1日2回の服用で、お昼のための携帯が不要です。忙しい方にも適しています。
- 生薬の粉末を生かしたお薬です。
- お薬の味が広がらない飲みやすい大きさの丸剤です。
- 本剤は補腎薬ですので、薄く食塩を入れたお湯で服用されることにより、塩分とともに成分が腎臓に運ばれ、一層効果が強められます。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1)医師の治療を受けている人
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3)胃腸が弱く下痢しやすい人
 - (4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
消化器	食欲不振、胃部不快感、吐き気・嘔吐、腹痛
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

便秘、下痢

4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(裏面につづく)

効能・効果

貧血性の耳鳴、腰痛、四肢及び腰の脱力感

用法・用量

次の量を白湯又は食塩を入れた温湯にて服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	9丸	朝・夕2回
15才未満	服用しないでください	

〔用法・用量に関連する注意〕

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)服用の前後30分は、お茶・コーヒー等を飲まないでください。

成分・分量

本品18丸は

ジオウ……………1,118.88mg	ポタンピ……………415.80mg
サンシュユ……………555.66mg	ブクリョウ……………415.80mg
サンヤク……………555.66mg	サイコ……………151.20mg
タクシャ……………415.80mg	ジセキ……………10.00mg

を含有する丸剤です。添加物としてハチミツ、薬用炭を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4)本剤は、時により丸剤と丸剤が付着して塊状となることがありますので、ご使用の時、ピンを軽く振るか、スプーンなどでほぐしてから用いてください。なお、薬効には変わりありませんので、安心して服用してください。
- (5)ピンの中につめ物は、輸送中に丸剤が破損するのを防ぐためのものです。開封後は不要となりますので取り除いてください。
- (6)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

●お問い合わせ先●

松浦薬業株式会社 お客様相談窓口

TEL (052)883-5172 受付時間 10:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

製造販売元

 **松浦薬業株式会社**
名古屋市昭和区円上町24-21