

しゃくやくかんそうとう
松浦の芍薬甘草湯ゼリー

本品はスティックタイプのゼリー剤です。水なしで服用いただけ、携帯に便利です。急激に起こる筋肉のけいれんに即座に対処できます。

枕元に置いていただき夜間の“こむらがえり”、ポケットに入れて歩行中の“足のつり”などに用いていただくと効果的です。



●使用上の注意●



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください。

次の診断を受けた人
心臓病

2. 症状があるときのみ服用にとどめ、連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1)医師の治療を受けている人
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3)高齢者
- (4)次の症状のある人
むくみ
- (5)次の診断を受けた人
高血圧、腎臓病

2. 服用後、まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
うっ血性心不全、 心室頻拍	全身のだるさ、動悸、息切れ、胸部の不快感、胸が痛む、めまい、失神等があらわれる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

●効能・効果●

体力に関わらず使用でき、筋肉の急激なけいれんを伴う痛みのあるものの次の諸症：
こむらがえり、筋肉のけいれん、腹痛、腰痛

●用法・用量●

次の量を食前又は食間に口の中でゼリーをくずして服用してください。
(食間とは食後2～3時間を指します。)

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1包	2回
15歳未満	服用しないでください	

【用法・用量に関連する注意】

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)開封後はすみやかに服用してください。
- (3)薬剤がのどにつかえることのないよう注意してください。
- (4)本品は1回分包装、飲みきりですので、分割服用しないでください。
- (5)分包の開封時に内容物が飛び散らないよう注意してください。
- (6)切り取り部分で唇を切らないよう注意してください。

●成分・分量● 本剤2包(20g)中

芍薬甘草湯エキス(1/2量)…………… 1.75g
(ジャコヤク…………… 3g カンゾウ…………… 3g)

添加物として、粉末還元麦芽糖水アメ、アセスルファムカリウム、カラギーナン、カンテン末、キシリトール、エリスリトール、無水クエン酸、クエン酸ナトリウム水和物、安息香酸ナトリウム、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸ブチル、香料、エタノール、グリセリンを含有します。

●保管及び取扱い上の注意●

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4)本剤は天然物を成分としていますので、製品により若干色調が異なることがありますが、効果には変わりありません。
- (5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (6)携帯するときは、分包が折り曲がらないようにしてください。

●お問い合わせ先●

松浦薬業株式会社 お客様相談窓口

TEL (052)883-5172 受付時間 10:00～17:00 (土・日・祝日を除く)

製造販売元

 **松浦薬業株式会社**
名古屋市昭和区円上町24-21