

ヨクイニン錠

古くから肌荒れやいぼに用いられるヨクイニンを含有し、いぼ、肌荒れに効果があります。

⚠️【使用上の注意】

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1)医師の治療を受けている人
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
- * (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
* 皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
* 消化器	胃部不快感

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

下痢

- * 4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

イボ、皮膚のあれ

【用法・用量】

次の量を食間又は空腹時に温湯にて服用してください。
(食間とは食後2～3時間を指します。)

年 齢	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	4錠	3回
15才未満	服用しないでください	

【用法・用量に関連する注意】

用法・用量を厳守してください。

【成分・分量】

本品は12錠中

ヨクイニン末…………… 3,000mg

を含有する錠剤です。

添加物として、リン酸水素Ca、メタケイ酸アルミン酸Mg、ステアリン酸Mg、クロスカルメロースNa、バレイショデンブン、乳糖を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4)乾燥剤は薬がなくなるまで捨てないでください。
- (5)本剤は生薬を原料としていますので、製品により若干色調が異なることがあります。が、効果には変わりありません。
- (6)ピンの中のもの物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開封後は不要となりますので取り除いてください。
- (7)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

【お問い合わせ先】

松浦薬業株式会社 お客様相談窓口

TEL (052)883-5172 受付時間10:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元

 松浦薬業株式会社

愛知県名古屋市昭和区円上町24-21